


PORCS CHARCUTIERS ET TRUIES

Indicateurs clés de Bien-être Animal



Les indicateurs de bien-être sont une méthode d'évaluation axée sur l'animal de facteurs qui contribuent à la qualité de son bien-être. Tandis que l'apport de certaines ressources environnementales (intrants) est nécessaire à la maximisation du « potentiel bien-être animal » d'un système, la mesure d'indicateurs axés sur les animaux indique objectivement le niveau de bien-être de ces derniers. Le calcul régulier d'indicateurs de bien-être pertinents peut permettre d'identifier des problèmes de bien-être et servir à déterminer des objectifs ou des seuils en matière d'améliorations à réaliser au moyen d'un plan de progrès. Ci-dessous se trouve une sélection des principaux indicateurs recommandés pour les porcs et les truies reproductrices.

LES BOITERIES

MESURE : Évaluation de la prévalence des boiteries chez les truies gestantes et les porcs en fin d'engraissement.

RAISON : Les boiteries indiquent des blessures et des infections pouvant entraîner douleurs, intimidation par les autres porcs et réformes. La détection précoce permet un isolement, un traitement et un rétablissement.

MÉTHODE : Protocole d'évaluation des boiteries mis au point dans le cadre du projet AssureWel : www.assurewel.org/pigs/lameness.

❖ Observez les individus pendant qu'ils marchent et enregistrez l'identité des porcs boiteux (marquez les porcs boiteux).

OBJECTIF : Moyenne de boiteries inférieure à 5 %.

LES MARQUES CORPORELLES

MESURE : Évaluation de la prévalence et de la gravité des lésions.

RAISON : Les marques corporelles et les plaies sont dues à l'agressivité ou aux comportements de monte (généralement suite au mélange de porcs ne se connaissant pas), à une forte densité et à une mauvaise conception des enclos ; elles indiquent peur, douleurs et détresse potentielles.

MÉTHODE : Protocole d'évaluation des marques corporelles mis au point par le BPEX et illustré par des photos (p. 4-7) :

<http://smartstore.bpex.org.uk/articles/dodownload.asp?a=smartstore.bpex.org.uk.26.3.2013.16.13.6.pdf&i=302866>

❖ Observez un côté de l'animal et enregistrez le nombre de lésions, leur type et leur gravité.

OBJECTIF : Nombre peu élevé de lésions mineures et aucune lésion grave parmi l'ensemble des individus.

L'ÉTAT D'ENGRASSEMENT

MESURE : Évaluation et surveillance des changements de l'état d'engraissement des truies.

RAISON : Un bon état d'engraissement est nécessaire à une bonne reproduction/lactation, et la surveillance permet de gérer l'alimentation de manière à éviter les variations de poids excessives ou à repérer une concurrence lors de l'alimentation.

MÉTHODE : Protocole d'évaluation de l'état d'engraissement mis au point dans le cadre du projet AssureWel : <http://www.assurewel.org/pigs/bodycondition>. Guide visuel du Defra (le ministère britannique de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales) :

<http://adlib.everysite.co.uk/resources/000/250/231/PB3480.pdf>

❖ Observez l'animal de côté et de derrière, et attribuez-lui une note de 1 (maigre) à 5 (gras).

OBJECTIF : Note de 3 (ne tombant pas en-dessous de 2 pendant la lactation).

LA PROPRETÉ

MESURE : Évaluation de la surface du corps souillée (sauf par la boue, qui sert à la régulation thermique).

RAISON : Les porcs se couchent dans leurs excréments lorsque l'espace ou les températures environnementales sont inadéquats ; ceci indique un inconfort et un risque de maladies de peau, de parasites, d'irritation et d'odeur de la viande.

MÉTHODE : Protocole d'évaluation de la propreté mis au point dans le cadre du projet AssureWel : <http://www.assurewel.org/pigs/manureonthebody>.

❖ Observez un côté de l'animal et attribuez un indice de 0 (propre) à 2 (très sale).

OBJECTIF : Plus de 80 % des porcs obtiennent un indice de 0 et moins de 5 % un indice de 2.

L'UTILISATION DES ENRICHISSEMENTS

MESURE : Évaluation de l'utilisation des matériaux d'enrichissement présents dans les enclos.

RAISON : Le bon apport d'enrichissements limite les comportements anormaux et favorise les comportements positifs propres à l'espèce, y compris l'exploration, la recherche de nourriture, le jeu et l'interaction sociale.

MÉTHODE : Protocole d'évaluation de l'utilisation des enrichissements mis au point dans le cadre du projet AssureWel : <http://www.assurewel.org/pigs/enrichmentuse>.

❖ Attribuez au comportement oral des porcs debout/assis une des mentions suivantes : utilisation des enrichissements, manipulation des autres porcs ou des équipements, ou mâchonnement de cailloux (pour les truies en plein air).

OBJECTIF : Les enrichissements occupent 15 à 20 % du temps des porcs.

LES LÉSIONS À LA QUEUE

MESURE : Évaluation de la prévalence et de la gravité des lésions à la queue des porcs charcutiers.

RAISON : Les lésions à la queue viennent de morsures dues à l'ennui et à la frustration, au manque d'espace, à l'inconfort thermique ou aux maladies. Les lésions peuvent être douloureuses et entraîner des réformes/un déclassement des carcasses.

MÉTHODE : Protocole d'évaluation des lésions à la queue mis au point dans le cadre du projet AssureWel : <http://www.assurewel.org/pigs/taillesions>. Photo-guide (p. 8-9) :

<http://smartstore.bpex.org.uk/articles/dodownload.asp?a=smartstore.bpex.org.uk.26.3.2013.16.13.6.pdf&i=302866>

- ❖ Observez l'individu de dos et attribuez-lui un indice de 0 (lésions non existantes à minimales) à 2 (graves).

OBJECTIF : Plus de 80 % des porcs obtiennent un indice de 0 et moins de 5 % obtiennent un indice de 2.

LA MORTALITÉ

MESURE : Enregistrement du nombre de porcs morts ou euthanasiés dans l'exploitation ainsi que des causes.

RAISON : La mortalité peut être due à des blessures chroniques, des maladies et à une gestion ou des conditions environnementales non optimales. Elle indique des douleurs, des souffrances et une performance non optimale.

MÉTHODE : Protocole d'évaluation de la mortalité mis au point dans le cadre du projet AssureWel : <http://www.assurewel.org/pigs/mortality>.

- ❖ Porcelets : Les causes courantes sont l'écrasement, les coups de froid, un poids insuffisant à la naissance, le retard de croissance.
- ❖ Porcs à l'engraissement : Les causes courantes sont les boiteries, les morsures à la queue, le retard de croissance.
- ❖ Truies : Les causes courantes sont les boiteries et la mauvaise performance reproductive.

OBJECTIF : Mortalité inférieure à 5 % en pré-sevrage, à 3 % pour les porcs en engraissement et à 3 % pour les truies.

AUTRES MESURES : Porcs nécessitant des soins supplémentaires/un séjour à l'infirmerie ; pour les truies reproductrices : longévité, lésions aux épaules et à la vulve ; pour les porcs en engraissement : retard de croissance, morsures aux oreilles/aux flancs.

INDICATEURS COMPORTEMENTAUX CHEZ LE PORC

Comportements positifs	Comportements négatifs
Fouissement, recherche de nourriture	Agressivité – combats, poursuites, coups de tête, morsures à la vulve (pour les truies)
Interactions sociales, telles que le jeu (pour les porcs en engraissement)	Comportements redirigés – coups de groin au ventre, morsures à la queue, morsures aux pattes, morsures aux oreilles
Exploration	Léthargie, manque d'intérêt, refus de s'alimenter Agitation, vocalisations (couinements)

PROCÉDÉ : Mesurez les indicateurs > identifiez les facteurs de risque (associés à des résultats médiocres sur certains indicateurs) > évaluez la performance (en la comparant à celle d'autres exploitations ou d'autres fournisseurs) > ajustez les pratiques (pour améliorer les indicateurs de bien-être, au moyen d'incitations ou de sanctions selon le bon ou le mauvais respect des objectifs).